

ESTUDIO CIS nº 2.600

BARÓMETRO SANITARIO, 2005 (Primera oleada)

FICHA TÉCNICA

*DISEÑO MUESTRAL GENERAL DEL BARÓMETRO SOBRE EL SISTEMA SANITARIO. 2005*

Convenio:

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:

Población residente de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

6.801 entrevistas, distribuidas en tres submuestras de 2.267 entrevistas cada una.

Afijación:

No proporcional. Tras asignar 150 entrevistas a cada una de las 17 comunidades autónomas, el resto, hasta 6.705, se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población de cada comunidad. La muestra de La Rioja se amplía, para que alcance las 200 entrevistas, y, también, la de alguna otra Comunidad para facilitar la distribución de las entrevistas iniciales en 3 submuestras de igual tamaño. El resultado son las 6.801 entrevistas de la muestra, cuya distribución se presenta en el cuadro 1.

**Cuadro 1.** Distribución de las entrevistas por Comunidades Autónomas y oleadas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	TOTAL	<u>Oleada Submuestra 1</u>	<u>Oleada Submuestra 2</u>	<u>Oleada Submuestra 3</u>
01. Andalucía	870	290	290	290
02. Aragón	284	94	95	95
03. Asturias	276	92	92	92
04. Baleares	230	77	76	77
05. Canarias	311	104	104	103
06. Cantabria	208	69	69	70
07. Castilla-La Mancha	332	111	111	110
08. Castilla y León	436	145	146	145
09. Cataluña	823	274	274	275
10. Comunidad Valenciana	560	187	186	187
11. Extremadura	265	88	89	88
12. Galicia	461	154	153	154
13. Madrid	690	230	230	230
14. Murcia	260	86	87	87
15. Navarra	208	70	69	69
16. País Vasco	387	129	129	129
17. La Rioja	200	67	67	66
<b>TOTAL</b>	<b>6.801</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>

### **Ponderación:**

Dado que las tasas de muestreo son diferentes en cada comunidad autónoma, es necesario aplicar coeficientes de ponderación para tratar la muestra en su conjunto. Estos coeficientes se adjuntan en la ficha técnica de la submuestra correspondiente.

### **Período de referencia:**

El Barómetro Sanitario 2005 abarca el período de tiempo que va desde abril a noviembre de 2005. La muestra se ha dividido en 3 submuestras distintas, que corresponden a las tres oleadas del Barómetro. Cada oleada, 2.267 entrevistas, tiene representatividad nacional y sus resultados reflejan la situación del país en el período de celebración de las entrevistas. El Barómetro en su conjunto, esto es, la agregación de las 3 submuestras, refleja la situación media del período.

### **Procedimiento de muestreo:**

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

### **Error muestral:**

El conjunto de la muestra es representativo a nivel nacional con un error real de muestreo del  $\pm 1,21\%$  para un nivel de confianza del 95,5%, y  $P = Q$ , en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las muestras de cada una de las comunidades autónomas suponen errores de muestreo distintos en función del número de entrevistas. Como punto de referencia se señala que en submuestras con 200 entrevistas el error de muestreo, para un nivel de confianza del 95,5 por ciento en el supuesto de muestreo aleatorio simple, es de  $\pm 7\%$ ; en submuestras de 400 entrevistas es de  $\pm 5\%$ , y en las de 800 entrevistas es de  $\pm 3,54\%$ .

## *PRIMERA OLEADA DISEÑO DE LA SUBMUESTRA*

### Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.267.

Realizada: 2.260.

### Afijación:

No proporcional. La submuestra es una tercera parte de la muestra general, que sirve de base para el diseño. Hecha la afijación de las 6.801 entrevistas por comunidades autónomas y estratos, se procede a la desagregación de la muestra general en tres submuestras de 2.267 entrevistas. Esta desagregación se hace estrato por estrato, de forma que en cada submuestra estén presentes todos los estratos con igual o similar número de entrevistas. Posteriormente se seleccionan los municipios y secciones de cada submuestra por el procedimiento señalado en la muestra general.

### Ponderación:

Dado que la muestra no es proporcional, resulta necesario ponderarla. Los coeficientes de ponderación se incluyen en el cuadro 2.

### Error muestral:

La submuestra es representativa a nivel nacional con un error real de muestreo de  $\pm 2,10\%$  para un nivel de confianza del 95,5%, y  $P = Q$ , en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las submuestras de cada una de las comunidades autónomas tienen aquí errores elevados, dado el pequeño número de entrevistas que se realizan en las mismas. Se podrán analizar los datos a nivel de comunidad autónoma sólo en Andalucía, Cataluña y Madrid, con errores de muestreo entre el  $\pm 5,8\%$  y el  $\pm 6,7\%$ .

### Puntos de muestreo:

46 Provincias.

144 Municipios.

### Fecha de realización:

Del 8 al 18 de abril de 2005.

**Cuadro 2. Coeficientes de ponderación**

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Coeficientes de ponderación
01 Andalucía	1,3758
02 Aragón	0,7189
03 Asturias	0,6803
04 Baleares	0,6021
05 Canarias	0,9273
06 Cantabria	0,4526
07 Castilla-La Mancha	0,8779
08 Castilla y León	0,9739
09 Cataluña	1,2789
10 Comunidad Valenciana	1,2290
11 Extremadura	0,6642
12 Galicia	1,0340
13 Madrid	1,3054
14 Murcia	0,7284
15 Navarra	0,4369
16 País Vasco	0,9250
17 La Rioja	0,2288