

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

17.638 entrevistas.

Realizada:

17.616 entrevistas. Distribuidas como se indican en el cuadro 3.

Afijación:

No proporcional. Se han asignado 800 entrevistas fijas a cada Comunidad autónoma. El resto, hasta 14.717, se ha distribuido proporcionalmente a la población de cada Comunidad, excepto en las Comunidades autónomas uniprovinciales de Asturias, Baleares, Cantabria, Navarra y La Rioja, en las que no se han modificado las 800 entrevistas iniciales.

A las Comunidades autónomas de Murcia y País Vasco se les ha dado un tratamiento distinto. En Murcia se han realizado 1.620 entrevistas distribuidas de la siguiente forma: 600 en el municipio de Murcia, 400 en el de Cartagena, 200 en la Mancomunidad oriental (001, Abanilla; 010, Beniel; 020, Fortuna; 901, Santomera) y 420 en el resto. En el País Vasco se han asignado 1.300 entrevistas: 400 en la provincia de Álava, 400 en la de Guipúzcoa y 500 en la de Vizcaya.

Del total de entrevistas de cada Comunidad, se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años (ver cuadro 1).

Ponderación:

Para devolver la proporcionalidad a la muestra a nivel nacional, se habrán de aplicar los coeficientes de ponderación que se incluyen en el cuadro 2.

Puntos de Muestreo:

744 municipios y 48 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de ± 0.81 para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

1 de febrero al 30 de marzo de 1994.

CUADRO 1

Muestra diseñada: distribución de entrevistas por grupos de edad y Comunidades autónomas.

| COMUNIDAD AUTÓNOMA | 16-34 | 35 y más años | TOTAL |
|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 1 ANDALUCÍA | 677 | 677 | 1354 |
| 2 ARAGÓN | 451 | 451 | 902 |
| 3 ASTURIAS | 400 | 400 | 800 |
| 4 BALEARES | 400 | 400 | 800 |
| 5 CANARIAS | 462 | 462 | 924 |
| 6 CANTABRIA | 400 | 400 | 800 |
| 7 CASTILLA-LA MANCHA | 470 | 470 | 940 |
| 8 CASTILLA Y LEÓN | 510 | 510 | 1020 |
| 9 CATALUÑA | 659 | 659 | 1318 |
| 10 C. VALENCIANA | 558 | 558 | 1116 |
| 11 EXTREMADURA | 444 | 444 | 888 |
| 12 GALICIA | 520 | 520 | 1040 |
| 13 MADRID | 608 | 608 | 1216 |
| 14 MURCIA | | | |
| Murcia | 300 | 300 | 600 |
| Cartagena | 200 | 200 | 400 |
| Manc. Oriental | 100 | 100 | 200 |
| Resto | 210 | 210 | 420 |
| 15 NAVARRA | 400 | 400 | 800 |
| 16 PAÍS VASCO | | | |
| Álava | 200 | 200 | 400 |
| Guipúzcoa | 200 | 200 | 400 |
| Vizcaya | 250 | 250 | 500 |
| 17 LA RIOJA | 400 | 400 | 800 |
| TOTAL | 8.819 | 8.819 | 17.638 |

CUADRO 2

Coefficientes de ponderación de la muestra nacional¹.

| COMUNIDAD AUTÓNOMA | 16-34 | 35 y más años | N.C. edad |
|-------------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 1 ANDALUCÍA | 1,875 | 2,565 | 1,000 |
| 2 ARAGÓN | 0,429 | 0,821 | " |
| 3 ASTURIAS | 0,444 | 0,853 | " |
| 4 BALEARES | 0,313 | 0,483 | " |
| 5 CANARIAS | 0,612 | 0,822 | " |
| 6 CANTABRIA | 0,228 | 0,381 | " |
| 7 CASTILLA-LA MANCHA | 0,605 | 0,997 | " |
| 8 CASTILLA Y LEÓN | 0,829 | 1,514 | " |
| 9 CATALUÑA | 1,581 | 2,677 | " |
| 10 C.VALENCIANA | 1,229 | 1,872 | " |
| 11 EXTREMADURA | 0,409 | 0,658 | " |
| 12 GALICIA | 0,857 | 1,562 | " |
| 13 MADRID | 1,498 | 2,219 | " |
| 14 MURCIA | | | |
| Murcia | 0,185 | 0,277 | " |
| Cartagena | 0,144 | 0,212 | " |
| Manc. Oriental | 0,053 | 0,062 | " |
| Resto | 0,488 | 0,608 | " |
| 15 NAVARRA | 0,236 | 0,373 | " |
| 16 PAÍS VASCO | | | |
| Álava | 0,258 | 0,365 | " |
| Guipúzcoa | 0,601 | 1,028 | " |
| Vizcaya | 0,848 | 1,335 | " |
| 17 LA RIOJA | 0,109 | 0,203 | " |

¹ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real.

CUADRO 3

Muestra real: distribución de entrevistas por grupos de edad y Comunidades autónomas.

| COMUNIDAD AUTÓNOMA | 16-34 | 35 y más años | N.C. edad | TOTAL |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 ANDALUCÍA | 676 | 675 | 3 | 1354 |
| 2 ARAGÓN | 445 | 453 | 5 | 903 |
| 3 ASTURIAS | 398 | 401 | 1 | 800 |
| 4 BALEARES | 392 | 407 | 1 | 800 |
| 5 CANARIAS | 479 | 434 | 7 | 920 |
| 6 CANTABRIA | 393 | 404 | 3 | 800 |
| 7 CASTILLA-LA MANCHA | 465 | 471 | 2 | 938 |
| 8 CASTILLA Y LEÓN | 504 | 516 | 1 | 1021 |
| 9 CATALUÑA | 657 | 660 | 0 | 1317 |
| 10 C. VALENCIANA | 553 | 562 | 0 | 1115 |
| 11 EXTREMADURA | 436 | 448 | 4 | 888 |
| 12 GALICIA | 513 | 526 | 1 | 1040 |
| 13 MADRID | 603 | 604 | 8 | 1215 |
| 14 MURCIA | | | | |
| Murcia | 307 | 287 | 0 | 602 |
| Cartagena | 205 | 195 | 0 | 399 |
| Manc. Oriental | 90 | 110 | 0 | 199 |
| Resto | 205 | 219 | 3 | 420 |
| 15 NAVARRA | 384 | 405 | 2 | 791 |
| 16 PAÍS VASCO | | | | |
| Álava | 186 | 212 | 2 | 400 |
| Guipúzcoa | 203 | 189 | 6 | 398 |
| Vizcaya | 248 | 251 | 1 | 500 |
| 17 LA RIOJA | 392 | 400 | 4 | 796 |
| TOTAL | 8.734 | 8.829 | 54 | 17.616 |

ESTUDIO CIS nº 2080

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO, DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

1.354 entrevistas.

Realizada:

1.354 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,845; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,155. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente 1².

Puntos de Muestreo:

74 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 2,82$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 de febrero al 17 de marzo de 1994.

2 Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Aragón.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

902 entrevistas.

Realizada:

903 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,684; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,311. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente 1³.

Puntos de Muestreo:

37 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,62$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 al 18 de febrero de 1994.

³ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Asturias.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

800 entrevistas.

Realizada:

800 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,684; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,313, En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente 1⁴.

Puntos de Muestreo:

24 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,74$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 al 21 de febrero de 1994.

⁴ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Baleares.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

800 entrevistas.

Realizada:

800 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,785; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,207, En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente ¹⁵.

Puntos de Muestreo:

30 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,74$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 de febrero al 20 de marzo de 1994.

⁵ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO, DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Canarias.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

924 entrevistas.

Realizada:

920 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,859; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,155. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente 1⁶.

Puntos de Muestreo:

33 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,41$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 al 25 de febrero de 1994.

⁶ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Cantabria.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

800 entrevistas.

Realizada:

800 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,747; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,246. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente ⁷.

Puntos de Muestreo:

31 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,41$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

3 al 16 de febrero de 1994.

⁷ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

940 entrevistas.

Realizada:

938 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,754; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,234. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente 1⁸.

Puntos de Muestreo:

62 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,48$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 de febrero al 20 de marzo de 1994.

⁸ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

1.020 entrevistas.

Realizada:

1.021 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,705; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,288. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente 1⁹.

Puntos de Muestreo:

62 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,39$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 al 18 de febrero de 1994.

⁹ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Cataluña.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

1.318 entrevistas.

Realizada:

1.317 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,742; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,257. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente 1¹⁰.

Puntos de Muestreo:

55 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 2,95$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

1 al 19 de febrero de 1994.

¹⁰ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Valencia.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

1.116 entrevistas.

Realizada:

1.115 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,791; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,205. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente ¹¹.

Puntos de Muestreo:

53 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,16$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 al 20 de febrero de 1994.

¹¹ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Extremadura.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

888 entrevistas.

Realizada:

888 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,764; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,229. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente ¹².

Puntos de Muestreo:

56 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,57$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 al 16 de febrero de 1994.

¹² Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Galicia.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

1.040 entrevistas.

Realizada:

1.040 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,706; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,287. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente ¹³.

Puntos de Muestreo:

59 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,35$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 al 18 de febrero de 1994.

¹³ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Madrid.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

1.216 entrevistas.

Realizada:

1.215 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,806; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,193. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente ¹⁴.

Puntos de Muestreo:

22 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,01$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

1 de febrero al 8 de marzo de 1994.

¹⁴ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO, DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Murcia.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

1.620 entrevistas.

Realizada:

1.620 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Se han asignado 600 entrevistas al municipio de Murcia, 400 al de Cartagena, 200 a la Mancomunidad oriental (Abanilla, 001; Beniel, 010; Fortuna, 020; Santomera, 901) y 420 al resto de la provincia. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Para devolver la proporcionalidad a la muestra se han de aplicar los siguientes coeficientes¹⁵:

| | <u>16-34</u> | <u>35 y +</u> | <u>N.C. edad</u> |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| Murcia | 0,663 | 0,991 | 1.000 |
| Cartagena | 0,514 | 0,761 | " |
| Manc. Oriental | 0,191 | 0,223 | " |
| Resto | 1,746 | 2,176 | " |

Puntos de Muestreo:

27 municipios.

¹⁵ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 2,93$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

3 al 20 de febrero de 1994.

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Navarra.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

800 entrevistas.

Realizada:

791 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,769; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,219. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente ¹⁶.

Puntos de Muestreo:

37 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,74$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 de febrero al 20 de marzo de 1994.

¹⁶ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real

ESTUDIO CIS nº 2080

OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO, DROGAS Y ALCOHOL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de País Vasco.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

1.300 entrevistas.

Realizada:

1.298 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Se han asignado 400 entrevistas a la provincia de Álava, 400 a la de Guipúzcoa y 500 a la de Vizcaya. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Para devolver la proporcionalidad a la muestra se han de aplicar los siguientes coeficientes¹⁷:

| | <u>16-34</u> | <u>35 y +</u> | <u>N.C. edad</u> |
|-----------|--------------|---------------|------------------|
| Álava | 0,337 | 0,477 | 1.000 |
| Guipúzcoa | 0,784 | 1,342 | " |
| Vizcaya | 1,107 | 1,743 | " |

Puntos de Muestreo:

49 municipios.

¹⁷ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,00$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

2 al 18 de febrero de 1994.

**OPINIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES ANTE EL CONSUMO DE TABACO,
DROGAS Y ALCOHOL**

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de La Rioja.

Universo:

Población de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada:

800 entrevistas.

Realizada:

796 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Del total de entrevistas se ha asignado un 50% a la población de 16 a 34 años, la más expuesta al riesgo de drogas, y el resto a la población de 35 y más años.

Ponderación:

Al grupo 16-34 años hay que aplicar un coeficiente de ponderación de 0,696; al grupo de 35 y más, un coeficiente de 1,297. En los casos en que no se identifica la edad, se aplica el coeficiente 1¹⁸.

Puntos de Muestreo:

33 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 3,74$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización:

1 al 16 de febrero de 1994.

¹⁸ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real