

ESTUDIO C.I.S. nº 2223

BARÓMETRO SANITARIO 1996-1997 (Primera oleada)

FICHA TÉCNICA

DISEÑO MUESTRAL GENERAL DEL BARÓMETRO SOBRE EL SISTEMA SANITARIO. 1996-1997

Convenio:

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

6.801 entrevistas, distribuidas en tres submuestras de 2.267 cada una. Este tamaño es similar al del *"Barómetro sobre el sistema sanitario. 1995"*.

Afijación:

No proporcional. Tras asignar 150 entrevistas a cada una de las 17 comunidades autónomas, el resto, hasta 6.705, se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población de cada comunidad. La muestra de La Rioja se amplía, para que alcance las 200 entrevistas y, también, la de alguna otra comunidad para facilitar la distribución de las entrevistas iniciales en 3 submuestras de igual tamaño. El resultado son las 6.801 entrevistas de la muestra, cuya distribución se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución de las entrevistas por comunidades autónomas y oleadas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	TOTAL	<u>Oleada Submuestra</u> 1	<u>Oleada Submuestra</u> 2	<u>Oleada Submuestra</u> 3
01 Andalucía	870	290	290	290
02 Aragón	284	94	95	95
03 Asturias (Principado de)	276	92	92	92
04 Baleares (Islas)	230	77	76	77
05 Canarias	311	104	104	103
06 Cantabria	208	69	69	70
07 Castilla-La Mancha	332	111	111	110
08 Castilla y León	436	145	146	145
09 Cataluña	823	274	274	275
10 Comunidad Valenciana	560	187	186	187
11 Extremadura	265	88	89	88
12 Galicia	461	154	153	154
13 Madrid (Comunidad de)	690	230	230	230
14 Murcia (Región de)	260	86	87	87
15 Navarra (Comunidad foral)	208	70	69	69
16 País Vasco	387	129	129	129
17 Rioja (La)	200	67	67	66
TOTAL	6.801	2.267	2.267	2.267

Ponderación:

Dado que las tasas de muestreo son diferentes en cada comunidad autónoma, es necesario aplicar coeficientes de ponderación para tratar la muestra en su conjunto. Estos coeficientes se adjuntan en la ficha técnica de la submuestra correspondiente.

Período de referencia:

El Barómetro sanitario 1996-1997 abarca el período de tiempo que va desde el otoño de 1996 a la primavera de 1997. La muestra se ha dividido en 3 submuestras distintas, que corresponden a las tres oleadas del Barómetro. Cada oleada, 2.267 entrevistas, tiene representatividad nacional y sus resultados reflejan la situación del país en el período de celebración de las entrevistas. El Barómetro en su conjunto, esto es, la agregación de las 3 submuestras, refleja la situación media del período.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

El conjunto de la muestra es representativo a nivel nacional con un error de muestreo del $\pm 1,21$ para un nivel de confianza del 95,5% y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las muestras de cada una de las comunidades autónomas suponen errores de muestreo distintos en función del número de entrevistas. Como punto de referencia se señala que en submuestras con 200 entrevistas el error de muestreo, para un nivel de confianza del 95,5% y en el supuesto de muestreo aleatorio simple, es de ± 7 ; en submuestras de 400 entrevistas es de ± 5 y en las de 800 entrevistas es de $\pm 3,53$.

**PRIMERA OLEADA
DISEÑO DE LA SUBMUESTRA**

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.267.

Realizada: 2.263.

Afijación:

No proporcional. La submuestra es una tercera parte de la muestra general que sirve de base para el diseño. Hecha la afijación de las 6.801 entrevistas por comunidades autónomas y estratos, se procede a la desagregación de la muestra general en tres submuestras de 2.267 entrevistas. Esta desagregación se hace estrato por estrato, de forma que en cada submuestra estén presentes todos los estratos con igual o similar número de entrevistas. Posteriormente se seleccionan los municipios y secciones de cada submuestra por el procedimiento señalado al hablar de la muestra general.

Ponderación:

Dado que la muestra no es proporcional, resulta necesario ponderarla. Los coeficientes de ponderación se incluyen en el cuadro 2.

Error muestral:

La submuestra es representativa a nivel nacional con un error de muestreo de $\pm 2,1$ para un nivel de confianza del 95,5% y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las submuestras de cada una de las comunidades tienen aquí errores muy elevados, dado el pequeño número de entrevistas que se realizan en las mismas. Se podrán analizar los datos a nivel de comunidad autónoma sólo en Andalucía (291), Cataluña (274) y Madrid (230), aunque con errores de muestreo elevados: $\pm 5,9$, $\pm 6,0$ y $\pm 6,6$ respectivamente.

Puntos de muestreo:

45 Provincias.

131 Municipios.

Fecha de realización:

Del 11 al 19 de octubre de 1996.

Cuadro 2. Coeficientes de ponderación

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Coeficientes de ponderación
01 Andalucía	1,325
02 Aragón	0,759
03 Asturias (Principado de)	0,736
04 Baleares (Islas)	0,561
05 Canarias	0,832
06 Cantabria	0,447
07 Castilla-La Mancha	0,881
08 Castilla y León	1,057
09 Cataluña	1,305
10 Comunidad Valenciana	1,175
11 Extremadura	0,699
12 Galicia	1,086
13 Madrid (Comunidad de)	1,255
14 Murcia (Región de)	0,681
15 Navarra (Comunidad foral de)	0,449
16 País Vasco	0,987
17 Rioja (La)	0,236

ESTUDIO Nº 2223
DISEÑO MUESTRAL 1ª OLEADA

- Comunidad de Andalucía -

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 290.

Realizada: 291.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Error muestral:

La submuestra es representativa con un error de muestreo de " 5,9 para un nivel de confianza del 95,5 por cien y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 12 al 18 de octubre de 1996.

- Comunidad de Cataluña -

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 274.

Realizada: 274.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Error muestral:

La submuestra es representativa con un error de muestreo de "6,0 para un nivel de confianza del 95,5 por cien y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 13 al 18 de octubre de 1996.

- Comunidad de Madrid -

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 230.

Realizada: 230.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Error muestral:

La submuestra es representativa con un error de muestreo de "6,6 para un nivel de confianza del 95,5 por cien y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 11 al 19 de octubre de 1996.