

ESTUDIO CIS nº 9.097
ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 1997 -Global-
FICHA TÉCNICA

Estudios de referencia

Estudio 2237 (1ª oleada) del 18 de febrero al 17 de marzo de 1997
Estudio 2247 (2ª oleada) del 19 de mayo al 15 de junio de 1997
Estudio 2256 (3ª oleada) del 15 de septiembre al 12 de octubre de 1997
Estudio 2268 (4ª oleada) del 24 de noviembre al 21 de diciembre de 1997

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Adultos: Población de 16 años y más
Niños: Población de 0 a 15 años

Muestra teórica -tamaño-:

Adultos: 6.400 entrevistas
Niños: 2.000 entrevistas

Muestra real:

Adultos: 6.396 entrevistas
Niños: 1.987 entrevistas

Ponderación:

Si se desea explotar ambas submuestras conjuntamente es necesario aplicar los siguientes coeficientes de ponderación: adultos 1,034; niños 0,892.

	<u>OLEADAS</u>			
	<u>PRIMERA</u>	<u>SEGUNDA</u>	<u>TERCERA</u>	<u>CUARTA</u>
<u>ADULTOS</u>				
- Entrevistas realizadas .	1.600	1.597	1.599	1.600
- Fecha de realización ...	18 feb. a 17 mar	19 may. a 15 jun.	15 sept. a 12 oct.	24 nov. a 21 dic.
<u>NIÑOS</u>				
- Entrevistas realizadas .	494	500	500	493
- Fecha de realización ...	24 feb a 9 mar.	26 may. a 8 jun.	22 sept. a 5 oct.	1 dic. a 14 dic.

Muestra de adultos

La muestra de adultos se estructura en 4 oleadas, submuestras mensuales, que se aplican trimestralmente. A su vez, cada submuestra se divide en 4 bloques semanales de 400 entrevistas.

La estructura completa de la muestra teórica es la siguiente:

1.- La muestra base:

- . Período de referencia o de aplicación del campo: un año
- . Entrevistas: 6.400
- . Afijación: proporcional a la población de los diferentes estratos
- . Número de submuestras: 4

2.- Las submuestras:

- . Período de referencia o de aplicación del campo: un mes
- . Entrevistas: 1.600
- . Afijación: proporcional a la población de los diferentes estratos
- . Número de bloques: 4

3.- Los bloques:

- . Período de referencia o de aplicación del campo: una semana
- . Número de entrevistas: 400
- . Afijación: proporcional a la población de los diferentes estratos

Muestra infantil

La muestra de niños es similar a la de adultos y se aplica simultáneamente en el tiempo, aunque en su extracción y aplicación es independiente. Se divide en 4 oleadas de 500 entrevistas, y cada oleada 2 bloques semanales de 250 entrevistas.

La estructura completa de la muestra teórica es la siguiente:

1.- La muestra base:

- . Período de referencia o de aplicación del campo: un año
- . Entrevistas: 2.000
- . Afijación: proporcional a la población de los diferentes estratos
- . Número de submuestras: 4

2.- Las submuestras:

- . Período de referencia o de aplicación del campo: quince días
- . Entrevistas: 500
- . Afijación: proporcional a la población de los diferentes estratos
- . Número de bloques: 2, que, se aplican coincidiendo con el segundo y tercer bloque de la correspondiente submuestra de adultos

3.- Los bloques:

- . Período de referencia o de aplicación del campo: una semana
- . Número de entrevistas: 250
- . Afijación: proporcional a la población de los diferentes estratos