ESTUDIO CIS nº 8.807

BARÓMETRO SANITARIO 2007 (Total tres oleadas)

FICHA TÉCNICA

DISEÑO MUESTRAL GENERAL DEL BARÓMETRO SOBRE EL SISTEMA SANITARIO. 2007

Estudios de referencia

Estudio 2679 (1ª oleada) del 3 al 9 de marzo de 2007 Estudio 2729 (2ª oleada) del 2 al 9 de julio de 2007 Estudio 2739 (3ª oleada) del 1 al 9 de noviembre de 2007

Convenio:

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población residente de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 6.801 entrevistas, distribuidas en tres submuestras de 2.267 entrevistas cada una.

Realizada: 6.745 entrevistas.

1ª submuestra2.252 entrevistas2ª submuestra2.254 entrevistas3ª submuestra2.239 entrevistas

Afijación:

No proporcional. Tras asignar 150 entrevistas a cada una de las 17 Comunidades autónomas, el resto, hasta 6.705, se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población de cada Comunidad. La muestra de La Rioja se amplía, para que alcance las 200 entrevistas, y, también, la de alguna otra Comunidad para facilitar la distribución de las entrevistas iniciales en 3 submuestras de igual tamaño. El resultado son las 6.801 entrevistas de la muestra, cuya distribución se presenta en el cuadro 1.

<u>Cuadro 1.</u> Distribución de las entrevistas por Comunidades autónomas y oleadas.

| COMUNIDADES AUTÓNOMAS | TOTAL | Oleada Submuestra 1 | Oleada Submuestra 2 | Oleada Submuestra 3 |
|--------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01. Andalucía | 873 | 291 | 291 | 291 |
| 02. Aragón | 282 | 94 | 94 | 94 |
| 03. Asturias | 276 | 92 | 92 | 92 |
| 04. Baleares | 231 | 77 | 77 | 77 |
| 05. Canarias | 309 | 103 | 103 | 103 |
| 06. Cantabria | 207 | 69 | 69 | 69 |
| 07. Castilla-La Mancha | 333 | 111 | 111 | 111 |
| 08. Castilla y León | 432 | 144 | 144 | 144 |
| 09. Cataluña | 822 | 274 | 274 | 274 |
| 10. Comunidad Valenciana | 585 | 195 | 195 | 195 |
| 11. Extremadura | 255 | 85 | 85 | 85 |
| 12. Galicia | 435 | 145 | 145 | 145 |
| 13. Madrid | 714 | 238 | 238 | 238 |
| 14. Murcia | 270 | 90 | 90 | 90 |
| 15. Navarra | 210 | 70 | 70 | 70 |
| 16. País Vasco | 366 | 122 | 122 | 122 |
| 17. La Rioja | 201 | 67 | 67 | 67 |
| TOTAL | 6.801 | 2.267 | 2.267 | 2.267 |

Ponderación:

Dado que las tasas de muestreo son diferentes en cada Comunidad autónoma, es necesario aplicar coeficientes de ponderación para tratar la muestra en su conjunto. Estos coeficientes se adjuntan en la ficha técnica de la submuestra correspondiente.

Período de referencia:

El Barómetro Sanitario 2007 abarca el período de tiempo que va desde marzo a noviembre de 2007. La muestra se ha dividido en 3 submuestras distintas, que corresponden a las tres oleadas del Barómetro. Cada oleada, 2.267 entrevistas, tiene representatividad nacional y sus resultados reflejan la situación del país en el período de celebración de las entrevistas. El Barómetro en su conjunto, esto es, la agregación de las 3 submuestras, refleja la situación media del período.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 Comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

El conjunto de la muestra es representativo a nivel nacional con un error de muestreo del \pm 1,2% para un nivel de confianza del 95,5%, y P=Q, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las muestras de cada una de las Comunidades autónomas suponen errores de muestreo distintos en función del número de entrevistas. Como punto de referencia se señala que en submuestras con 200 entrevistas el error de muestreo, para un nivel de confianza del 95,5 por ciento en el supuesto de muestreo aleatorio simple, es de \pm 7,0%; en submuestras de 400 entrevistas es de \pm 5%, y en las de 800 entrevistas es de \pm 3,5%.

<u>Cuadro 2.</u> Coeficientes de ponderación

| COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Primera submuestra | Segunda submuestra | Tercera submuestra |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Andalucía | 1,351 | 1,381 | 1,418 |
| 02 Aragón | 0,716 | 0,716 | 0,706 |
| 03 Asturias | 0,643 | 0,644 | 0,632 |
| 04 Baleares | 0,525 | 0,519 | 0,517 |
| 05 Canarias | 0,812 | 0,821 | 0,808 |
| 06 Cantabria | 0,435 | 0,435 | 0,431 |
| 07 Castilla-La Mancha | 0,870 | 0,871 | 0,871 |
| 08 Castilla y León | 0,963 | 0,938 | 0,924 |
| 09 Cataluña | 1,330 | 1,336 | 1,368 |
| 10 Comunidad Valenciana | 1,264 | 1,252 | 1,257 |
| 11 Extremadura | 0,648 | 0,649 | 0,640 |
| 12 Galicia | 1,025 | 1,026 | 1,009 |
| 13 Madrid | 1,301 | 1,319 | 1,300 |
| 14 Murcia | 0,747 | 0,739 | 0,752 |
| 15 Navarra | 0,455 | 0,442 | 0,438 |
| 16 País Vasco | 0,940 | 0,933 | 0,917 |
| 17 La Rioja | 0,248 | 0,241 | 0,240 |